莱芜地区桃小食心虫发生规律及药剂防治效果

赵楠^{1,2}, 于毅¹, 张安盛¹, 门兴元¹, 周仙红¹,
庄乾营¹, 张思聪¹, 许永玉^{2*}, 李丽莉^{1*}

(1. 山东省农业科学院植物保护研究所, 山东省植物病毒学重点实验室, 济南 250100;

2. 山东农业大学植物保护学院, 泰安 271018)

摘要 2011—2012 两年间对莱芜地区桃小食心虫成虫田间消长规律进行系统调查, 发现该虫在莱芜地区一年可发生 1~2 代, 越冬代成虫的发生受 5 月份降水量的影响, 降水量影响成虫羽化高峰期的出现时间以及持续时间。用 35% 氯虫苯甲酰胺水分散粒剂 8 500 倍液, 12% 高效氯氟菊酯·毒死蜱水乳剂 5 000 倍液, 2.5% 高效氯氟菊酯微乳剂 3 000 倍液, 20% 毒死蜱微囊悬浮剂 1 000 倍液喷施防治效果均可达到 80% 以上, 可在果园中推荐使用。

关键词 桃小食心虫; 发生规律; 杀虫剂; 防治效果

中图分类号: S 436.611.2 文献标识码: A DOI: 10.3969/j.issn.0529-1542.2014.01.034

Occurrence regularity and chemical control of *Carposina sasakii* Matsumura in Laiwu City

Zhao Nan^{1,2}, Yu Yi¹, Zhang Ansheng¹, Men Xingyuan¹, Zhou Xianhong¹,
Zhuang Qianying¹, Zhang Sicong¹, Xu Yongyu², Li Lili¹

(1. Key Laboratory for Plant Virology of Shandong, Institute of Plant Protection, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Ji'nan 250100, China; 2. College of Plant Protection, Shandong Agricultural University, Taian 271018, China)

Abstract Occurrence of the peach fruit moth (*Carposina sasakii* Matsumura) in apple orchard in Laiwu City were investigated from 2011 to 2012. The results showed that the pest occurred for 1-2 generations per year and the precipitation affect the occurrence time and duration time of the overwintering adults. Meanwhile, the effect of 7 common chemical insecticides on *C. sasakii* was evaluated. The control efficacy of 35% chlorantraniliprole WG diluted 8 500 time, 12% beta-cypermethrin · chlorpyrifos EW diluted 5000 times, 2.5% lambda-cyhalothrin ME diluted 3 000 times and 20% chlorpyrifos CS diluted 1 000 times can reach more than 80%, which can be recommended to apply in the orchard.

Key words *Carposina sasakii*; occurrence; insecticides; control effect

桃小食心虫 [*Carposina sasakii* Matsumura], 又名桃蛀果蛾, 属于鳞翅目 (Lepidoptera) 蛀果蛾科 (Carposinidae), 在我国果树产区均有发生, 可为害仁果类、核果类等十几种果树的果实^[1]。20 世纪 50 年代初期在辽南的苹果产区为害严重, 果实被害率一般达 30% 左右, 个别果园虫果率达 100%。桃小食心虫的田间为害具有隐蔽性, 而且越冬幼虫出土持续时间长, Lee 等发现田间桃小食心虫越冬幼虫发生时间跨度相当大^[2], 李定旭研究认为越冬幼虫

出土期在 70 d 以上^[3], 这都增加了田间防治的难度。近年来, 由于高毒农药在果园的禁用, 桃小食心虫在不套袋果园为害逐年加重, 因此一直是落叶果树生产中的重点防治对象。

李爱华^[4]、王鹏^[5]、凌飞^[6]等调查泰安以及济南等地区的桃小食心虫种群发生情况, 发现在不同地区和年度间成虫发生期有着明显的差异, 因此在防治上无统一的关键期, 而盲目用药不但防效差, 还污染环境增加害虫抗药性。本研究从苹果园桃

小食心虫成虫发生规律以及新型低毒杀虫剂筛选入手,提出桃小食心虫防治的关键时期并筛选出高效低毒的化学药剂,为有效防治桃小食心虫提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验地选在山东省莱芜市莱城区高庄街道办事处

处黄沟村果园内(36°12'N,117°40'E),海拔 200 m 左右,果园面积 1 hm² 左右,树龄 20 年,株行距为 3 m×4 m,树高 4 m 左右,苹果主要品种为‘金帅’。试验地为丘陵地,砂壤土,管理粗放,桃小食心虫常年发生。所用诱芯为中国科学院动物所生产,有效期 2 年,剂量 0.2 mg,载体为蓝色反口橡皮头。化学药剂及用量如表 1。

表 1 供试药剂

Table 1 The insecticides tested

药剂名称 Insecticides	英文通用名 Common name	生产厂家 Producer
0.6%苦参碱 AS	Matrine	清源保生物科技有限公司
1.5%除虫菊素 EW	Pyrethrins	清源保生物科技有限公司
2.5%高效氯氟氰菊酯 ME	<i>lambda</i> -Cyhalothrin	红太阳集团南京第一农药厂
12%高效氯氟氰菊酯·毒死蜱 EW	<i>beta</i> -Cypermethrin + chlorpyrifos	南京红太阳股份有限公司
2.5%高效氯氟氰菊酯 EW	<i>lambda</i> -Cyhalothrin	山西科锋农业科技有限公司
20%毒死蜱 CS	Chlorpyrifos	江苏嘉隆化工有限公司
35%氯虫苯甲酰胺 WG	Chlorantraniliprole	上海杜邦农化有限公司

试验设空白对照,即在相同时间喷洒等量的清水,除此之外不做其他处理。

1.2 试验方法

1.2.1 桃小食心虫成虫消长规律调查

2011、2012 年两年均在 5 月 15 日开始在田间悬挂水盆性诱芯诱捕器调查桃小食心虫发生情况,诱捕器的间距为 15 m 以上,共计 4 个。性诱剂诱捕器参照王鹏 2010 年设置^[5]。每天上午 08:00—09:00 时检查记录盆内桃小食心虫成虫数量,并及时清除塑料盆内当天诱集的昆虫,下大雨或连续降雨无法下地时不调查,为制表方便,将 3 次调查数据合并为一次。每月更换一次诱芯。

1.2.2 杀虫剂田间试验方法与设计

施药时间:2011 年 6 月 29 日和 7 月 14 日各喷药一次。每小区 5 株树,60 m² 左右,小区随机区组排列,每处理重复 4 次,小区间设隔离行和保护树。用药量 3 000 L/hm²。用高压机动喷雾器全株均匀喷雾,施药量以叶片、果实均匀着药,稍有药滴下滴为度。在用药 35 d 以后进行虫果数调查。

1.3 调查及统计分析方法

桃小食心虫卵粒小且分散,因此查找卵比较困难,故未作杀卵效果测定,只调查虫果数。方法是:每小区调查 4 株树,在每个调查树的树冠四周及内

膛的中上部即东、西、南、北、中 5 个方位随机检查 80 个果实,共计 400 个果实,记录其中虫果数。按下列公式计算防效。

新增虫果数 = 施药后各期虫果数 - 施药前虫果数;

防治效果(%) =

$$\frac{\text{对照区新增虫果数} - \text{施药区新增虫果数}}{\text{对照区新增虫果数}} \times 100.$$

采用 SPSS17.0 软件分析,进行组间均值数据的 One-Way ANOVA 方差分析。

2 结果与分析

2.1 桃小食心虫成虫田间消长规律

根据田间诱集结果绘制出莱芜地区桃小食心虫成虫消长动态(图 1)。调查发现,桃小食心虫在所调查果园中一年发生 1~2 代,越冬代发生高峰期在每年的 6 月中下旬。2011 年,田间成虫发生始末期为 5 月底到 9 月下旬,田间共出现 2 次比较明显的高峰,分别是 6 月中旬和 8 月下旬。而 2012 年直到 6 月上旬才诱到成虫,且 8 月下旬以后几乎很少诱到成虫,发生时间明显短于 2011 年。2012 年成虫发生时期较集中,6 月下旬出现一个主要高峰后,7 月下旬和 8 月上旬各出现一个小高峰。

根据气温变化趋势(图 2)发现,2012 年 5 月份的平均气温略高于 2011 年,6 月份平均气温 2 年间差异不大,根据阿帕尔等^[7]的研究结果可以计算出这 2 个月的 5 cm 以下平均地温值,都满足杨承建^[8]研究结论中适合桃小食心虫幼虫出土的地温要求,因此影响桃小食心虫成虫发生时间差异的主要原因不是温度。

图 1 山东莱芜地区桃小食心虫成虫消长动态

Fig. 1 The occurrence of the peach fruit moth in Laiwu, Shandong

图 2 2011 年与 2012 年 5、6 月气温变化趋势

Fig. 2 The change trend of temperatures in May and June in 2011 and 2012

观察两年的降雨情况发现(表 2),2011 年,整个 5 月份降雨 6 次,超过 10 mm 的降雨 3 次,总降雨量 94.1 mm,6 月份降雨 2 次,总降水量为 64 mm,5 月份的首次降雨为 5 月 8 日。而 2012 年 5、6 月份降

雨 2 次,总降水量为 59.2 mm,而且主要集中在 5 月中旬之前,5 月份的首次降雨为 5 月 13 日。分析认为这些差异是导致 2012 年越冬代成虫发生始期、发生高峰期晚于 2011 年的主要原因。2012 年 5 月 14 日到 7 月 7 日之间无有效降雨对桃小食心虫越冬幼虫的出土、卵的孵化、幼虫生长发育均造成不利影响,所以在 8 月 25 日之后基本没有桃小食心虫成虫出现。其成虫出现的高峰时间也基本和杨承建^[9]的研究结果相同,即成虫高峰期出现在 5 月份首次降雨后 24 日左右,当 5 月首次降水量大于 40 mm 时,幼虫出土高峰期及成虫发生高峰期向后推迟。即我们可以在 5 月首次有效降雨后 8 d 左右防治出土越冬幼虫,24 d 左右喷雾防治第一代幼虫,若降雨超过 40 mm,则推后 2~3 d 防治。桃小食心虫的越冬幼虫出土期持续时间较长,因此还需要根据实际降雨情况增加施药次数。

表 2 2011 年与 2012 年 4—7 月降水量

Table 2 The precipitation from April to July in 2011 and 2012

年份 Year	日期/月-日 Date	降水量/mm Precipitation	年份 Year	日期/月-日 Date	降水量/mm Precipitation
2011	04-20	5	2012	04-24	10
2011	04-21	9	2012	05-13	54.2
2011	04-29	4	2012	05-29	5
2011	05-08	28	2012	07-07	3
2011	05-11	30	2012	07-08	20
2011	05-16	5.5	2012	07-09	25
2011	05-17	20.6	2012	07-10	5
2011	05-18	8	2012	07-29	2
2011	05-20	2	2012	07-31	15
2011	06-22	62			
2011	06-28	2			
2011	07-03	65			
2011	07-13	2			
2011	07-17	12			
2011	07-18	5			
2011	07-19	2			
2011	07-24	37			
2011	07-25	52			
2011	07-29	6			

2.2 7 种杀虫剂对桃小食心虫的田间防治效果

7 种杀虫剂对桃小食心虫的田间防治效果见表 3。结果表明:所选用的 7 种药剂都对桃小食心虫发生有一定的抑制作用。其中,效果最好的是 2.5% 高效氯氟氰菊酯微乳剂 3 000 倍液,田间防治效果达到了 $(84.97 \pm 0.89)\%$,其次是 20% 毒死蜱微囊悬浮剂 1 000 倍液、35% 氯虫苯甲酰胺水分散剂 8 500 倍液

和12%高效氯氟菊酯·毒死蜱水乳剂5 000倍液,田间防治效果均达到80%以上,可以有效降低虫果率。相比之下,0.6%苦参碱水剂2 000倍液和1.5%除虫

菊素水乳剂2 000倍液的田间防治效果相对较差一些,仅为(67.32±3.46)%和(63.30±3.71)%,与其他几种药剂有着明显差距($P<0.05$)。

表3 7种杀虫剂对桃小食心虫的田间防治效果¹⁾

Table 3 Control effects of seven insecticides to peach fruit moth in fields

药剂名称 Insecticides	药剂浓度 Concentration	调查苹果数/个 Number of apples investigated	新增虫果数/个 Increasing number of infected apples	虫果率/% Percentage of apples with borers	防治效果/% Control effect
2.5%高效氯氟菊酯 ME	3 000	1 600	38	(2.38±0.24)d	(84.97±0.89)a
20%毒死蜱 CS	1 000	1 600	46	(2.88±0.16)cd	(81.62±1.03)ab
35%氯虫苯甲酰胺 WG	8 500	1 600	48	(3.00±0.20)cd	(80.67±1.98)ab
12%高效氯氟菊酯·毒死蜱 EW	5 000	1 600	50	(3.13±0.33)cd	(80.21±1.50)ab
2.5%高效氯氟菊酯 EW	3 000	1 600	56	(3.50±0.20)c	(77.68±0.99)b
0.6%苦参碱 AS	2 000	1 600	81	(5.06±0.34)b	(67.32±3.46)c
1.5%除虫菊素 EW	2 000	1 600	91	(5.69±0.34)b	(63.30±3.71)c
空白对照 CK	—	1 600	251	(15.69±0.66)a	—

1) 表中数据为平均值±标准误,同列数据不同字母表示在0.05水平差异显著。

Data in the table are Mean±SE. Different small letters in the same column indicate significant difference at 0.05 level.

3 讨论

3.1 降雨对桃小食心虫成虫田间消长的影响

桃小食心虫的发生量易受环境因素的影响,种群数量随着温度和降水量的变化而变化,其发生为害规律在各年间也不尽相同^[9]。温度可以满足桃小食心虫越冬幼虫发育的情况下,其出土及羽化主要取决于降水量。Lee^[2]等报道降水量少会造成桃小食心虫延迟出土,杨承建^[8]等认为有效降雨(10~30 mm)会促进越冬幼虫的出土,而超过40 mm的降雨则会延迟幼虫出土。通过两年对比发现桃小食心虫成虫发生始期、高峰期、持续时间在年度间差异较大,但均和5月份首次降雨有关,与杨承建^[8]等的结论相符,成虫高峰期出现在5月份首次降雨后24 d左右,当5月首次降水量大于40 mm时,幼虫出土高峰期及成虫发生高峰期向后推迟。因此可以在5月首次有效降雨后8 d左右防治出土越冬幼虫,24 d左右喷雾防治第一代幼虫。若降水量超过40 mm,则防治时间推后2~3 d。

3.2 桃小食心虫的田间防治

桃小食心虫的为害具有隐蔽性、钻蛀性,一旦蛀入则很难防治,因此要抓住关键防治期,即第一代幼虫钻蛀前进行化学防治。2.5%高效氯氟菊酯微乳剂、20%毒死蜱微囊悬浮剂、35%氯虫苯甲酰胺水分散剂剂和12%高效氯氟菊酯·毒死蜱水乳剂对桃小食心虫防效可以达80%以上,可以在田间推荐

使用。

对桃小食心虫应采取综合防治措施,应重视农业防治、生物防治及物理防治措施。随着套袋技术的推广应用以及高毒农药在果园中禁用,使得果农对桃小食心虫的防治警惕性和效果越来越差,但据作者多年调查,桃小食心虫在山楂园、枣园为害仍很严重,虫果率高达50%以上,应引起足够重视。

参考文献

- [1] 刘玉升,程家安,牟吉元. 桃小食心虫的研究概况[J]. 山东农业大学学报(自然科学版),1997,28(2):207-214.
- [2] Lee S W, Hyun J S, Park J S. Studies on the developments of the overwinter peach fruit moth[J]. Korean Journal of Plant Protection,1984,23(1):42-48.
- [3] 李定旭. 桃小食心虫地面防治技术的研究[J]. 植物保护,2002,28(3):18-20.
- [4] 李爱华,张勇,张辉,等. 枣园桃小食心虫的发生动态及生防技术研究[J]. 中国果树,2012(2):53-56.
- [5] 王鹏,凌飞,于毅,等. 济南地区混栽果园桃小食心虫发生情况及防治研究[J]. 山东农业科学,2010(8):69-71.
- [6] 凌飞,王鹏,许永玉,等. 山东肥城单植桃园食心虫发生与为害规律[J]. 山西农业大学学报(自然科学版),2010,30(4):320-324.
- [7] 阿帕尔,叶尔克江,冯俊平. 昌吉市地温与气温关系初探[J]. 沙漠与绿洲气象,2007,1(3):53-56.
- [8] 杨承建. 桃小食心虫幼虫出土期及成虫发生期的预测[J]. 中国果树,2000(3):31-32.
- [9] 杨美红,张金桐. 性引诱剂防治桃园桃小食心虫试验[J]. 山西农业大学学报(自然科学版),2005,25(4):348-349.